

▶ Cabinet Dentaire Montaigne

Cabinet dentaire des Dr Eric CEZANNE, Lucas CEZANNE, Charlotte LELEU et Léonor GAUTHIER

📍 8 avenue Montaigne 31830 Plaisance du Touch

☎ Tel. : +33 5 61 07 48 94

🌐 dr-eric-cezanne.chirurgiens-dentistes.fr


Les extractions dentaires

Une extraction dentaire consiste à enlever une dent de la bouche. Elle peut être conseillée pour plusieurs raisons.

POURQUOI UNE EXTRACTION DENTAIRE ?

- ▶ Il est parfois nécessaire d'extraire une ou plusieurs dents lors d'un stade avancé de carie. Il en est de même pour une dent montrant une fissure profonde ou une maladie de la gencive qui peut aussi rendre une dent mobile et douloureuse.
- ▶ Les dents incluses, dont les dents de sagesse qui souffrent souvent de malformations de croissance, sont également extraites si leur position entraîne des troubles.
- ▶ Enfin, l'extraction d'une ou plusieurs dents peut également être envisagée avant un traitement orthodontique ou implantaire.

À noter : L'extraction d'une dent est toujours précédée d'un questionnaire (recherche de risques hémorragiques) et d'une radiographie. Cet examen radiologique permettra de déterminer s'il faut procéder à une extraction simple ou à une extraction chirurgicale.



LES EXTRACTIONS SIMPLES


- ▶ Les extractions simples sont accomplies sur des dents qui sont visibles en bouche, qui ne sont pas endommagées excessivement par la carie et qui peuvent donc être extraites sans complication.
- ▶ L'opération, indolore, s'effectue sous anesthésie locale. Pour procéder à l'extraction, votre chirurgien-dentiste s'assure de l'insensibilité de la gencive, avant de dégager la dent et de la retirer.

- ▶ En cas d'une dent souffrant d'inflammation, le tissu lésé sera également enlevé. La fermeture de la cavité s'effectue à l'aide de points de suture servant à réunir les bords de la gencive.

“ Avec l'anesthésie, vous ne ressentirez aucune douleur durant l'intervention. ”

LES EXTRACTIONS CHIRURGICALES

- ▶ Les extractions chirurgicales concernent les dents qui présentent un accès difficile, qui ont des racines divergentes ou très courbées ou qui sont considérablement abîmées (carie importante par exemple).
- ▶ L'intervention commence également par une anesthésie locale, puis votre chirurgien-dentiste procède à une incision de la gencive et un fraisage du tissu osseux autour de la dent. Une fois la dent enlevée, la cavité est alors nettoyée.



TRAITEMENT DES SUITES DE L'EXTRACTION

- ▶ Des saignements peuvent apparaître à la suite de l'intervention. Chez le sujet sain, il s'arrête 3 à 4 minutes après l'extraction, mais des écoulements ou des suintements de sang peuvent se poursuivre pendant 48 heures. Le saignement sera contrôlé par une gaze de coton sur le site de l'extraction et en fermant la bouche pour créer une pression.
- ▶ Un gonflement temporaire sans gravité peut se produire et sera limité par l'application de glace (enveloppée dans un linge). En cas de douleur, des antalgiques seront prescrits. Un antibiotique pourra être donné si nécessaire afin de prévenir un éventuel risque d'infection.



À SAVOIR

Après l'extraction, il est recommandé de limiter les activités physiques intenses pendant 24 heures. Cela réduira les risques de saignements et aidera votre cicatrisation.

Pendant 24 heures, ne rincez pas votre bouche abondamment et évitez les boissons alcoolisées ou les bains de bouche, car cela peut provoquer des saignements. Aussi, il est recommandé de ne pas fumer pendant 3-4 jours après l'intervention.

L'anesthésie doit disparaître après quelques heures. En cas de problème, demandez conseil à votre chirurgien-dentiste.